



## إعطاء الطفل حقن هيدروكورتيزون باستخدام دواء Solu-Cortef Acto-vial

تعلمتم كيفية إعطاء حقنة هيدروكورتيزون (Solu-Cortef). تُعطى هذه الحقن للطفل في حال التقيؤ أو الإسهال أو فقدان الوعي أو التعرض لإصابة خطيرة مثل كسر في العظام.  
لا بد من إحضار المستلزمات التالية من حقيبة حقن الطوارئ:

- حقنة قياس 23 بطول 1 إنش
- حقنة قياس 5 ملل
- أو حقنة قياس 25 بطول 5/8 إنش
- أو حقنة قياس 3 ملل

مسحنا كلو هيكسيدين أو كحول وقطعة شاشة معقمة وضمادة Band-Aid

● Solu-Cortef Act-o-vial 100mg /2ml preparation Yellow cap DIN 00030600

● Solu-Cortef Act-o-vial 250mg /2ml preparation Red cap DIN 00030619

الكمية التي يجب إعطاؤها:

### لتحضير الحقنة:

1. تنظيف المساحة التي سيتم فيها تحضير الحقنة بدقة.
2. غسل اليدين.
3. الضغط بقوة على أعلى أنبوب Act-O-Vial لدفع السائل المسيل (السائل الشفاف) من الحجرة العلوية إلى الحجرة السفلى للامتزاج بالمسحوق.
4. رجّ أو تحريك أنبوب Act-O-Vial برفق لمزج السائل والمسحوق والحرص على عدم وجود أي كتل غير ممزوجة، ثم ترك المزيج حتى يهدأ لمدة دقيقة إلى أن يصبح شفافاً.
5. إزالة الغطاء البلاستيكي الذي يغطي وسط السداد وتنظيفه بإحدى المسحنتين.
6. كما تعلمتم، تُربط الإبرة بالحقنة مع الحرص على بقاء القطعتين معقمتين خلال تركيبهما.
7. إزالة غطاء الإبرة عبر الإمساك به من طرفه وسحبه برفق ووضعه في مكان نظيف.
8. إدخال الإبرة في وسط السداد.
9. قلب الأنبوب رأساً على عقب وسحب كمية الدواء ببطء.
10. سحب الهواء من الإبرة للتأكد من أن الجرعة تحتوي على الدواء فقط. قد يتطلب ذلك عدة محاولات.
11. وضع الغطاء على الإبرة من جديد لحمايتها من التلوث.

### لاعطاء الإبرة للطفل:



1. يُجلس الطفل في وضعية تبرز أكبر جزء من فخذ.
2. تُنظف البشرة بحركة دائرية بإحدى المسحات كما تعلّمتم.
3. يُزال غطاء الإبرة عبر الإمساك بطرفها وسحب الغطاء برفق.
4. تُمسك الإبرة باليد المهيمنة فيما تُمسك بشرة الفخذ باليد الأخرى.
5. تُفحم الإبرة بزاوية 90 درجة بحركة سريعة تُشبه حركة رمي سهم اللعب.
6. يُدفع الدواء بوتيرة منتظمة خلال أقل من 30 ثانية.
7. تُسحب الإبرة بسرعة ويتمّ الضغط على موقع الحقن بقطعة شاش معقمة. من الطبيعي حدوث نزيف.
8. يُمكن وضع ضمادة لاصقة عند الرغبة.
9. كما تعلّمتم، يُوضع الغطاء على الإبرة لتغطيتها.
10. تُوضع الإبرة في مستوعب للتخلص من الأدوات الحادة أو في مستوعب نفايات بلاستيكي.

في الحالات الطارئة، يُرجى الاتصال بطبيب الغدد الصماء المناوب على الرقم: 0-7600-737-613

إن كانت لديكم أسئلة خلال ساعات العمل، يُرجى الاتصال بمرضعة الغدد الصماء \_\_\_\_\_ على الرقم التالي:  
7600-737-613 تحويلة \_\_\_\_\_